




TILOSIL-50



Reg. SAGARPA Q-7982-004

COMPOSICIÓN.

Cada 200 g de **Tilosil-50** contiene:

Tartrato de Tilosina 100 g
Excipiente C.B.P. 200 g

MODO DE ACCIÓN.

TILOSIL-50 es un antibiótico Macrólido bacteriostático que se caracteriza por ser muy activo contra micoplasmas, bacterias Gram positivas y algunas Gram negativas susceptibles a la fórmula; actúa bloqueando la síntesis proteica de la bacteria a nivel ribosomal al unirse a la subunidad 30S.

TILOSIL-50 está indicado para el tratamiento de micoplasmosis, enfermedad crónica respiratoria, sinovitis infecciosa en pollo de engorda y reproductoras reemplazo, espiroquetosis en pavos, estreptococis, estafilococis, pasteurelosis y disenteria en porcina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS.

Aves: (pollo de engorda, reproductoras y pavos) 100 mg/kg de peso por día en agua de bebida durante 3 a 5 días lo que equivale a 2 g/l de **TILOSIL-50** el cual sirve para tratar 1000 aves de 1 kg de peso.

Porcinos: 10 mg/kg de peso por día en agua de bebida durante 3 a 5 días lo que equivale a 2g/l de **TILOSIL-50**. Un sobre de 200 gramos de **TILOSIL-50** en 1000 litros de agua sirve para tratar 329 cerdos de 30 kg de peso por día.

PERIODO DE RETIRO.

No administrar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

ALMACENAMIENTO.

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Sacos de 1,5, 10 y 20 kg en sobres de 200 g.