




PROSERVET

# AMOXITIL-50



Reg. SAGARPA Q7982-008

## COMPOSICIÓN.

Cada 1000 g de Amoxitil-50 contiene:

Amoxicilina Trihidratada	500 g
Excipiente C.B.P.	1000 g

## MODO DE ACCIÓN.

**AMOXITIL-50** es una penicilina semisintética de amplio espectro que puede actuar contra microorganismos no productores de la penicilinasasa. Se absorbe en un 70% a un 100% más que la ampicilina, su disponibilidad ha sido calculada en un 63% y su acción es tiempo dependiente.

**AMOXITIL-50** es altamente efectivo en el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas y sistémicas en aves, ocasionadas por microorganismos sensibles a la fórmula como: *Streptococcus*, *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Staphylococcus*, *Haemophilus*, *E. coli*, *Pasteurella* entre otros.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS.

Aves: (Engorda y Reproductoras) 200 a 400 g por 1000 L de agua durante 5 días continuos, 40 a 60 mg de producto activo por kg de peso.

Cerdos: 40 g de AMOXITIL-50 en 100 litros de agua equivalente a 20 mg por kg de peso durante 5 días.

Oral mezclado en el alimento cerdos lechones y engorda 800g de AMOXITIL-50 (400pm) de principio activo por tonelada durante 5 días. Reproductoras y sementales 800 g de AMOXITIL-50(400 ppm) de principio activo por tonelada de alimento durante 5 días.

## PERIODO DE RETIRO.

En aves no administrar este producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No se administre éste producto en aves en producción de huevo, destinado al consumo humano. En cerdos no administrar este producto 6 días antes del sacrificio de los cerdos para el consumo humano

## ALMACENAMIENTO.

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

## PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Empaques con 1, 5, 10 y 20 kg.